

10. september 2009

## **MEDICINERINGSFEJL – PSYKIATRISK BOTILBUD**

### **Hændelse**

En yngre mand i et psykiatrisk botilbud er i fast behandling med Cisordinol dråber (20 mg/ml) 1 ml dagligt. Som engangsordination får han yderligere Cisordinol 10 ml, svarende til 200 mg. (Max. døgndosis er normalt 20-40 mg dagligt ved kronisk skizofreni og andre kroniske psykoser).

### **Konsekvens**

Manden bliver bevidsthedssvækket, får blodtryksfald og hurtig puls samt hæmmet åndedræt. Han bliver indlagt akut på sygehuset til udredning og behandling i intensiv afdeling.

### **Årsag**

Da beboeren bliver svært urolig, ringer kontaktpersonen til den psykiatriske speciallægekonsulent. Han ordinerer mundtligt Cisordinol 1,0 ml som engangsordination. Med håndskrift noterer kontaktpersonen "1,0 ml" i beboerens plejeplan.

Dette sker i et vagtskifte, så en pædagog, der netop er mødt i aftenvagt, skal dispensere og administrere medicinen. Pædagogen er nyuddannet og har ikke stor erfaring med medicinering. Hun overser kommaet i plejeplanen og tolker ordinationen som 10 ml Cisordinol (200 mg).

I beboerens medicinskab står der en uåbnet flaske med 20 ml orale dråber Cisordinol 20 mg / ml; halvdelen hældes op. På grund af beboerens uro og modstand mod at indtage medicinen, bliver opmærksomheden rettet mod ham, og en faktor 10 fejl bliver ikke foregrebet.

### **Handlingsplan**

Kommunen tager sammen med speciallægekonsulenten og praksiskonsulenten initiativ til, at der udarbejdes en retningslinje om, at lægemidler altid skal ordineres i mg, suppleret med angivelse af antal tabletter eller ml samt indgiftsmåde (tabletter, injektion, orale dråber). Personalet må ikke længere anvende kommaer, der efterfølges af et nul, i dosis- og mængdeangivelser for medicin.

Det fremhæves, at mundtlige ordinationer så vidt muligt skal undgås. Hvis det ikke er muligt, benyttes princippet "skriv ned og læs op". Der udarbejdes en plakat, som formidles til relevante institutioner i regionen.

Endvidere udarbejdes der et dosisberegningsskema for Cisordinol med angivelse af mg = antal dråber = antal ml. Skemaet bliver sendt til regionens bosteder sammen

med et følgebrev om, at skemaet skal lægges i medicinskabet sammen med en lineal, der bruges til at lægge under den beregning, man skal dispensere efter.

Pædagoger, der er ansat i kommunens botilbud, gennemgår et medicinkursus med vægt på viden om de hyppigst anvendte lægemidler samt ansvar og kompetence i forbindelse med medicingivning.