

10. september 2009

MEDICINERINGSFEJL – ALMEN PRAKSIS OG HJEMMEPLEJEN

Hændelse

En mand, der får doseret medicin af hjemmeplejen, får paracetamol-tabletter 8 g i døgnet gennem to uger. (Max døgndosis er normalt 4 g).

Konsekvens

Fejldoseringen bliver opdaget af egen læge, der bliver tilkaldt til hjemmet, da manden lider af kvalme og opkastninger og har fået let gulsot (ikterus) som følge af leverpåvirkning. I første omgang bliver der taget akutte blodprøver. Lægen afventer blodprøvesvar før stillingtagen til akut indlæggelse på sygehus.

Årsag

Mandens egen læge har to uger tidligere ændret ordination af tbl Pinex til 1 g x 4 daglig som fast ordination mod hovedpine. Tidligere har manden fået tbl. Pinex 1 g x 2 daglig samt tbl. Pinex p.n. (efter behov) max 1 g x 2 daglig.

Ved ændring af medicinskemaet bliver den tidligere gældende p.n. Pinex-ordination ikke seponeret, bl.a. fordi p.n. doseringen står anført på et andet medicinskema end den faste medicin. Derfor bliver der lagt i alt 4 g Pinex i doseringsæsker, da social- og sundhedsassistent fra hjemmeplejen dispenserer medicin. Desuden får borgeren fuld dosis p.n. medicin, d.v.s. 2 g dagligt, da han angiver at have behov for dette.

Herudover viser det sig, at mandens hustru har givet ham tbl. Pamol 1 g x 2 daglig mod smerter i knæet, i den tro, at Pamol var et andet præparat end Pinex.

Handlingsplan

Fremover noteres der i medicinskemaet både antal tabletter, styrke og samlet døgndosis. Det generiske navn – paracetamol – angives i skemaet sammen med handelsnavnet. Fast medicin og p.n. ordinationer anføres på samme skema med henblik på at øge opmærksomheden på medicin, der gives både fast og som p.n.

Kommunen udarbejder sammen med praksiskonsulenten en skriftlig advarsel om, at Pinex, Pamol og Panodil er samme slags lægemiddel, der ved overdosering kan medføre forgiftning. De ansatte i hjemmeplejen informeres om advarslen, der lægges ud i hjemmene hos de borgere, der får doseret paracetamol. Praksiskonsulenten orienterer de praktiserende læger i kommunen om hændelsen og tiltag, der kan forhindre en gentagelse.

Hændelsen bliver – sammen med andre hændelser – brugt som case på temadage om patientsikkerhed i hjemmeplejen samt ved introduktion af nye medarbejdere.